



กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์

เล่มที่ 84

วันที่ประกาศโฆษณา

เลขที่ประกาศ 241

25 มิถุนายน 2567

**ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์**

เลขที่คำขอ 66100329 วันที่ยื่นคำขอ 15 มิถุนายน 2566  
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนบางนรา หรือ Durian Bang Nara หรือ Bang Nara Durian  
 รายการสินค้า ทุเรียน  
 ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนราธิวาส  
 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

**1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า**

**คำนิยาม**

ทุเรียนบางนรา หรือ Durian Bang Nara หรือ Bang Nara Durian หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี และมุซังคิง ที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างละเอียด เนื้อมีสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน มีกลิ่นเฉพาะตัวตามสายพันธุ์ ปลูกในแถบพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี และบริเวณเทือกเขาสันกาลาศีรี ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอสู่คีรีน อำเภอจะแนะ อำเภอสรีสาคร อำเภอเรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอบาเจาะ

**ลักษณะของสินค้า**

- (1) พันธุ์ทุเรียน : พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ก้านยาว พันธุ์ชะนี และพันธุ์มุซังคิง
- (2) ลักษณะเฉพาะทางกายภาพแยกตามสายพันธุ์

(2.1) พันธุ์หมอนทอง : ทรงผลมีลักษณะค่อนข้างยาวหรือขอบขนาน มีบ่าผล ปลายผลแหลม หนามแหลมตรงสูง ก้านผลใหญ่แข็งแรง ผลมีขนาดใหญ่ พุ่มไม้ไม่ค่อยเต็มทุกพู เนื้อหนา สีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียดและค่อนข้างแห้ง ไม่แฉะติดมือ เมล็ดเล็กและลีบ

(2.2) พันธุ์ก้านยาว : ทรงผลมีลักษณะกลม หนามเล็ก ถี่ สั้นสม่ำเสมอ ก้านผลใหญ่และยาว ผลมีขนาดปานกลาง เปลือกค่อนข้างหนา พุ่มไม้ชัดเจน พุ่มเต็มทุกพู เนื้อเนียนละเอียด สีเหลืองปานกลางจนถึงสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมันกลมกล่อม เมล็ดค่อนข้างกลมใหญ่

(2.3) พันธุ์ชะนี : ทรงผลมีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือรูปรีหรือทรงหวด ขั้วผลใหญ่และสั้น หนามมีขนาดใหญ่และสั้น ผลมีขนาดปานกลาง ร่องพูค่อนข้างลึกเห็นได้ชัด เนื้อละเอียด หนา สีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน กลิ่นแรง เมล็ดค่อนข้างเล็กหรือลีบ

(2.4) พันธุ์ชั่งคิง : ทรงผลมีลักษณะกลมหรือรูปรี หนามเว้าปลายแหลม บริเวณปลายฐานผลมน ไม่มีหนาม ก้นผลมองเห็นเป็นดาวห้าแฉกชัดเจน บริเวณฐานรองขั้วผลนูนคล้ายรูปมงกุฏ ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง พูไม่ชัดเจน เนื้อมาก เนื้อสีเหลืองเข้ม แห้งและละเอียดเหนียว มีเส้นใยน้อย รสชาติหวานมันเมล็ดเล็กกลีบ

## 2. กระบวนการผลิต

### การปลูก

(1) ต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ทุเรียนต้องตรงตามสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี และมุขชั่งคิง ที่มีความแข็งแรง ได้มาจากแหล่งผลิตต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้โดยใช้ต้นต่อทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

(2) พื้นที่การปลูกทุเรียนที่เหมาะสม ควรอยู่ในพื้นที่สูงตามไหล่เขาบริเวณเทือกเขาสันกาลาศีรี จนถึงพื้นที่ราบเชิงเขาในเขตลุ่มน้ำสายบุรี เป็นดินระบายน้ำได้ดี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป

(3) การปลูกทุเรียนสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ที่เหมาะสมควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

(4) การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก ควรปรับพื้นที่ให้ราบไม่มีแอ่งน้ำท่วมขัง กำจัดวัชพืช ไถซุดตอ รากไม้เก่า พร้อมทั้งกำหนดผังปลูก โดยวางแผนกำหนดแถวปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่ หรือกำหนดแถวปลูกในแนวทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และให้คำนึงถึงการวางระบบให้น้ำทุเรียนในแปลงปลูกด้วย

(5) ระยะปลูกที่เหมาะสมตั้งแต่ 8 x 8 เมตร ถึง 10 x 10 เมตร โดยขุดหลุมขนาด 1 x 1 เมตร หรือตามความเหมาะสม แล้วนำดินที่ขุดมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ก่อนนำต้นทุเรียนลงปลูก หรือวิธีการปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคกซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่มากและระยะเวลาการท่วมขังสั้น นิยมนำดินมาเทกองแล้วนำต้นทุเรียนลงปลูก

(6) ทำการปักไม้หลักข้างต้นทุเรียนที่ปลูกแล้ว พร้อมผูกเชือกยึดไว้เพื่อป้องกันลมพัดโยก จัดทำร่มเงาสำหรับต้นทุเรียนปลูกใหม่ และเมื่อต้นทุเรียนตั้งตัวดีแล้วจึงปลดออก

### การดูแลรักษา

(1) ควรมีการจัดการระบบน้ำสำหรับต้นทุเรียนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง และการระบายน้ำออกในช่วงฤดูฝน

(2) การให้น้ำต้องให้อย่างสม่ำเสมอ ตามความต้องการของแต่ละช่วงวัย โดยช่วงก่อนออกดอกต้องงดการให้น้ำเพื่อกระตุ้นการออกดอก และช่วงหลังดอกบาน ให้ลดปริมาณน้ำเหลือ 1 ใน 3 ของปริมาณปกติเพื่อช่วยในการ ติดผล หลังจากนั้นให้เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อยๆ และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงพัฒนาการของทุเรียน

(3) การใส่ปุ๋ยให้ต้นทุเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

(4) ทำการตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ กิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งที่ตาย กิ่งคดงอ และกิ่งเปื่อยเสียออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งแสง แดดส่องถึงภายในทรงพุ่ม

(5) กำจัดวัชพืช เศษหญ้า เศษใบไม้ใต้ทรงพุ่มเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศใต้ทรงพุ่ม การให้สารป้องกันโรคและแมลงด้วยวิธีการที่เหมาะสม

### การเก็บเกี่ยว

(1) ทูเรียนบางนรา จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี หรืออาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี

(2) ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว จะนับจำนวนวันหลังดอกบานจนถึงวันที่เริ่มเก็บเกี่ยวพร้อมเก็บเกี่ยวตามความเหมาะสมในแต่ละสายพันธุ์

(3) วิธีสังเกตลักษณะทูเรียนแก่ ดังนี้

(3.1) ก้านผล จะแข็งและมีสีเข้มขึ้น รู้สึกสากมือ

(3.2) ปากปลิง (ที่ก้านผล) ทูเรียนแก่จัดปากปลิงจะพองโตเห็นรอยต่อชัดเจน

(3.3) หนามผล ปลายหนามแห้ง เปราะและหักง่าย

(3.4) ร่องหนามห่าง เมื่อบีบปลายหนามเข้าหากันจะมีลักษณะยืดหยุ่นเหมือนรูสีกว่ามีสปริง

(3.5) รอยแยก ระหว่างผลจะสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้เด่นชัด ยกเว้นพันธุ์ก้านยาว

(3.6) เคาะเปลือกหรือกริดหนาม จะมีเสียงดังหลวมๆ

(4) การเก็บเกี่ยว สามารถเก็บด้วยวิธีการปีนต้นแล้วทำการตัดผลทูเรียนเลือกเฉพาะผลแก่จัดประมาณร้อยละ 80 - 90 นำส่งลงมาโดยมีการรองรับอยู่ข้างล่างเอาผลผลิตมาวางไว้บนผ้าใบหรือภาชนะที่สะอาด ห้ามวางทุเรียนกับพื้นดิน

### การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ ให้ประกอบด้วยคำว่า "ทูเรียนบางนรา" หรือ "Durian Bang Nara" หรือ "Bang Nara Durian"

(2) ให้ระบุชื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการฯ สถานที่ผลิตหรือจัดจำหน่าย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อพันธุ์ทูเรียน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

## 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

### ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึงลองจิจูดที่ 6 องศา 37 ลิปดาเหนือ เนื้อที่ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่เป็นป่าและภูเขาหนาแน่น ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดเทือกเขาสันกาลาศีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย - มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยเป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สายคือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก ธรณีวิทยาของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยหินตะกอนและหินแปร ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอจะนะ อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอบาเจาะ พบว่าทรัพยากรดินมีลักษณะสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 0 - 35 หรือมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะโครงสร้างดินส่วนใหญ่มีการระบายน้ำได้ดี

**ลักษณะภูมิอากาศ** จังหวัดนราธิวาส มีสภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น และฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งนำเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ส่งผลให้ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอาความชื้น จากอ่าวไทยเข้ามาทำให้ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับอิทธิพลจากเทือกเขาสันกาลาศีรี โดยมีแม่น้ำสายบุรีเป็นแหล่งนำพาความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อคุณภาพของทุเรียนที่ปลูกในแถบพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรีของจังหวัดนราธิวาส ทำให้มีคุณภาพโดดเด่น โดยเฉพาะในรสชาติหวานมันกลมกล่อม เนื้อแห้งละเอียด เส้นใยน้อย คุณภาพดี จนเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในชื่อว่า "ทุเรียนบางนรา"

### ประวัติความเป็นมา

จังหวัดนราธิวาส ชื่อในอดีตคือ “บ้านบางนรา” หรือ “บ้านมะนาลอ” เป็นชุมชนชาวประมงตั้งอยู่ปากแม่น้ำบางนราติดชายทะเลอ่าวไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราถูกจัดอยู่ในเขตการปกครองของเมืองสายบุรี ต่อมาเมืองปัตตานีถูกยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงโอนไปขึ้นกับเมืองระแงะ แห่งมณฑลปัตตานี ต่อมาบ้านบางนรา มีความเป็นอยู่หนาแน่นและเจริญเป็นชุมชนใหญ่กว่าตัวเมืองระแงะ จึงมีการย้ายศาลว่าการเมืองมาตั้งพร้อมยกฐานะขึ้นเป็น “เมืองบางนรา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ เมืองบางนรา เป็น “เมืองนราธิวาส” ซึ่ง “นราธิวาส” มีความหมายว่า ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำสายบุรี ได้หล่อเลี้ยงผู้คนชาวนราธิวาสตลอดสายน้ำได้ใช้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และทำประมง ซึ่งแม่น้ำสายบุรีมีต้นกำเนิดจากสายน้ำเล็กๆ บนเทือกเขาสันกาลาศีรี ในอดีตมีการทำเหมืองแร่ทองคำเพราะมีการสำรวจพบแร่ทองคำมากติดอันดับ 1 ใน 9 ของแหล่งแร่ทองคำที่พบในประเทศไทย จนได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำสายทองคำ และด้วยระบบนิเวศที่หลากหลายและมีน้ำตลอดปี ประกอบกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสันกาลาศีรี ทั้งป่า แหล่งน้ำ แหล่งแร่ ผสมกับความเชื่อว่าแม่น้ำสายบุรีเป็นสายน้ำจากสายแร่ทองคำ ส่งผลให้สภาพดินและสภาพพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำสายบุรี มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผลต่างๆ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เป็นต้น เห็นได้จากผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ลองกองต้นหยงมัส นอกจากนี้ ทุเรียนที่ปลูกบริเวณนี้ก็ได้อีกชื่อว่าเป็น ทุเรียนคุณภาพดี เนื่องด้วยวิถีของเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานและพัฒนาสู่การปลูกทุเรียนเป็นพืชหลัก จากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ปลูกทำให้ต้นทุเรียนได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี ประกอบกับความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ คือ ดินดี น้ำดี อากาศดี ตั้งแต่ภูเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำสายบุรี อีกทั้งมีป่าฮาลาบาลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “อเมซอนแห่งเอเชีย” โอบล้อมพื้นที่ ทำให้ “ทุเรียนบางนรา” มีคุณภาพดี เนื้อละเอียดและค่อนข้างแห้ง เคี้ยวละมุนลิ้น รสชาติหวานมันกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ มีการนำผลผลิตทุเรียนไปจำหน่ายในงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคติดใจในรสชาติ ทำให้มีความต้องการอย่างต่อเนื่องทุกปี

#### 4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การผลิต ทุเรียนบางนรา ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอสุคีริน อำเภोजะเนาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอบาเจาะ รายละเอียดตามแผนที่

#### 5. การพิสูจน์แหล่งกำเนิด


- (1) ทุเรียนบางนรา ต้องผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด และตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ทุเรียนบางนรา รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

#### 6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนบางนรา
- (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนบางนรา และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด

-----

## แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ทุเรียนบางนรา



ขอบเขตพื้นที่การผลิต ทุเรียนบางนรา ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอสุคีริน อำเภอจะแนะ อำเภอศรีสาคร อำเภอวังยาง อำเภอระแงะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเขาชะเมา และอำเภอเขาชะเมา