



กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

เล่มที่ 115
วันที่ประกาศโฆษณา

เลขที่ประกาศ 505
22 ตุลาคม 2569

ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เลขที่คำขอ 69100612 วันที่ยื่นคำขอ 26 มิถุนายน 2569
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมอนทองจันทน์ หรือ Monthong Chan Durian หรือ Monthong Chan
รายการสินค้า ทุเรียน
ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

หมอนทองจันทน์ หรือ Monthong Chan Durian หรือ Monthong Chan หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งมีลักษณะรูปทรงผลกลมถึงยาวรี เปลือกมีสีเขียวถึงสีเขียวปนน้ำตาล เปลือกค่อนข้างบาง ปลายหนามค่อนข้างแข็ง และแหลมคม ร่องพูลึก เนื้อมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม เนื้อหนา เนียนละเอียด มีรสชาติหวานมัน กลิ่นหอมปานกลางตามธรรมชาติของทุเรียน และมีเมล็ดลีบหรือเมล็ดขนาดเล็ก ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะของสินค้า

(1) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง รูปทรงผลกลมถึงยาวรี
- เปลือก มีสีเขียวถึงสีเขียวปนน้ำตาล เปลือกค่อนข้างบาง ปลายหนามค่อนข้างแข็ง และแหลมคม พูใหญ่ เด่นชัด ร่องพูลึก แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- เนื้อ มีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม เนื้อหนา เนียนละเอียด
- รสชาติและกลิ่น รสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมปานกลางตามธรรมชาติของทุเรียน
- เมล็ด มีเมล็ดลีบหรือเมล็ดขนาดเล็ก

(2) ลักษณะทางเคมี

- มีปริมาณน้ำหนักรับแห้ง (Dry Matter) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ขึ้นไป
- มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (Total Soluble Solids: TSS) ในช่วง 17 – 20 องศาบริกซ์

2. กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ

ต้นพันธุ์ทุเรียนต้องเป็นพันธุ์หมอนทองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การเสียบยอดหรือการทาบกิ่ง เป็นต้น เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์เอง หรือจัดซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือจากแหล่งพันธุ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การรับรองหรือแนะนำ ทั้งนี้ ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพควรมีใบสีเขียวเข้ม หนา เป็นมัน ทรงพุ่มสมบูรณ์ ลำต้นตรง แข็งแรง เปลือกเรียบ ปราศจากแผลหรือร่องรอยการทำลายของศัตรูพืช กิ่งแขนงกระจายรอบลำต้นอย่างสมดุล สำหรับต้นพันธุ์ที่ได้จากการเสียบยอดหรือทาบกิ่ง รอยต่อต้องประสานสนิท แข็งแรง ไม่มีรอยแยกหรือบวมผิดปกติ และมีระบบรากสมบูรณ์ ไม่ขาด

การปลูก

- (1) ฤดูปลูก ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอยู่ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
- (2) พื้นที่ปลูก สามารถปลูกได้ในพื้นที่หลากหลายลักษณะ ได้แก่ บริเวณเชิงเขา พื้นที่ริมทะเล พื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และการระบายน้ำ
- (3) การเตรียมพื้นที่ ต้องเตรียมพื้นที่ให้มีการระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในทุเรียน โดยอาจใช้วิธีการยกโคก ยกร่อง ทำร่องระบายน้ำ ปรับพื้นที่เป็นลอน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- (4) การเตรียมหลุมและระยะปลูก ขุดหลุมปลูกและรองก้นหลุมด้วยวัสดุ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น โดยกำหนดระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 8×8 เมตร หรือ 10×10 เมตร ทั้งนี้ สามารถปรับระยะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยควบคุมทรงพุ่มให้โปร่งและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่ม
- (5) การปลูก นำกิ่งพันธุ์ลงปลูกในหลุม กลบดินให้แน่นพอเหมาะ และจัดให้มีวัสดุค้ำยันเพื่อป้องกันต้นล้มตามความจำเป็น ในกรณีที่ต้องพรางแสง อาจใช้วัสดุพรางแสง เช่น ตาข่ายพรางแสง ทางมะพร้าว เป็นต้น หรือปลูกพืชให้ร่มเงาที่เหมาะสม

การดูแลรักษา

- (1) การให้น้ำ ควรมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียนในแต่ละระยะ โดยทุเรียนอายุ 1 – 3 ปี ต้องการน้ำประมาณ 5 – 20 ลิตรต่อต้นต่อวัน ระยะติดดอก 50 ลิตรต่อต้นทุก 3 – 5 วัน ระยะติดผล 100 – 150 ลิตรต่อต้นทุก 2 วัน และระยะสร้างเนื้อ 200 – 300 ลิตรต่อต้นต่อวัน ทั้งนี้ ปรับปริมาณน้ำตามสภาพอากาศ อายุของต้น สภาพดิน และความชื้นในพื้นที่
- (2) การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโต เพื่อบำรุงต้น ส่งเสริมการออกดอกและพัฒนาผล การพัฒนาผล ตลอดจนการสร้างและพัฒนาคุณภาพเนื้อทุเรียน
- (3) การป้องกันและกำจัดโรคพืช ควรเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดยใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชให้เหมาะสมกับชนิดและความรุนแรงของโรค ตามคำแนะนำและอัตราที่กำหนด หากพบการระบาดรุนแรง ควรตัดส่วนที่เป็นโรคและนำไปทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวตามที่ระบุในฉลาก และไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่กำหนดให้ใช้ระยะดังกล่าว

(4) การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ควรเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ โดยใช้สารป้องกันกำจัดแมลงให้เหมาะสมกับชนิดและความรุนแรงของการระบาด ตามคำแนะนำและอัตราที่กำหนด และเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวตามที่ระบุในฉลาก และไม่น้อยกว่า 15 วัน ในกรณีที่กำหนดให้ใช้ระยะดังกล่าว

(5) การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอทุก 2 – 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้วัชพืชหนาแน่นหรือสูงจนกระทบต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน และลดแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช

(6) การผสมเกสรและการจัดการผล ควรผสมเกสรเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการติดผล โดยดำเนินการตั้งแต่ช่วงเย็นซึ่งเหมาะสมต่อการผสมเกสร และตัดแต่งคัดเลือกผลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีจำนวนมากเกินไป เพื่อควบคุมจำนวนผลให้เหมาะสมกับความสมบูรณ์และขนาดของต้น

(7) การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มให้สมบูรณ์และโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และลดการสะสมของโรคและแมลง โดยตัดกิ่งที่อยู่ต่ำเกินไป กิ่งซ้อนหรือเบียดกัน กิ่งแห้ง กิ่งที่เจริญขึ้นในแนวตั้งซ้อนกัน และกิ่งที่ชี้เข้าหาลำต้น รวมทั้งจัดระยะห่างระหว่างกิ่งข้างให้เหมาะสม และคงกิ่งหลักที่สมบูรณ์สำหรับการติดผล

(8) การแยกรุ่นผลผลิต กรณีมีผลผลิตตั้งแต่ 2 รุ่นขึ้นไป ควรทำเครื่องหมายแยกรุ่นโดยใช้เชือกหรือวัสดุสีต่างกันผูกบริเวณกิ่งของแต่ละรุ่น เพื่อจำแนกรุ่นและป้องกันการเก็บเกี่ยวผิดรุ่น ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นที่สามารถจำแนกรุ่นผลผลิตได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

(1) ช่วงเก็บเกี่ยว หมอนทองจันทมีฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคม

(2) อายุการเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวผลที่มีความแก่จัด โดยพิจารณาจากอายุผลประมาณ 120 วันนับจากวันที่ดอกบาน หรือมีปริมาณน้ำหนักแห้ง (Dry Matter) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32

(3) ลักษณะผลที่แก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว สังเกตได้จากชั่วผลมีผิวสากเป็นเม็ดทราย ปากปลิงบวมและเห็นรอยต่อกับชั่วผลชัดเจน ปลายหนามแห้ง แข็ง สีสน้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย เปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวปนน้ำตาล ร่องพูมีรอยแยกชัดเจน น้ำหนักผลไม่ถ่วงมือ และเมื่อผ่าหรือตัดบริเวณขั้วปลิงจะมีน้ำใส รสออกหวาน และมีลักษณะเหนียว

(4) วิธีการเก็บเกี่ยว สามารถเก็บเกี่ยวโดยปีนต้นและตัดผลโดยตรง หรือใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยว โดยมีผู้รับผลด้านล่าง ใช้กระสอบป่านหรือวัสดุรองรับผลเพื่อป้องกันการกระแทกและการตกถึงพื้น ทั้งนี้ ภายหลังตัดผลจากต้นแล้ว ควรใช้วัสดุสะอาดรองรับผลและหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นดินโดยตรง

การคัดเกรด

หมอนทองจันท แบ่งตามคุณภาพและขนาดผลออกเป็น 5 เกรด ดังนี้

(1) เกรดพรีเมียม มีพูเต็มไม่น้อยกว่า 4 พู ผลมีความสมบูรณ์ รูปทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว และผิวเปลือกด้านนอกอาจมีตำหนิเล็กน้อย โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 2.2 – 5.5 กิโลกรัม

(2) เกรดดี มีพูเต็มไม่น้อยกว่า 3 พู รูปทรงอาจบิดเบี้ยวเล็กน้อย และผิวเปลือกด้านนอกอาจมีตำหนิได้ โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 2.0 – 5.5 กิโลกรัม

(3) เกรดพอใช้ มีพูเต็มไม่น้อยกว่า 2 พู ผิวเปลือกด้านนอกอาจมีตำหนิได้ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อภายใน โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 1.8–6.0 กิโลกรัม

(4) เกรดลูกเล็ก มีพูเต็มไม่น้อยกว่า 2 พู และมีน้ำหนักตั้งแต่ 1.5 – 2.0 กิโลกรัม

(5) เกรดลูกใหญ่ มีพูเต็มไม่น้อยกว่า 3 พู และมีน้ำหนักตั้งแต่ 5.5 กิโลกรัมขึ้นไป

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

(1) การขนย้าย ควรจัดวางทุเรียนใส่ในเข่ง หรือ กล่อง หรือ ลัง หรือ ตะกร้า หรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการกระทบกระเทือนระหว่างขนส่ง

(2) การบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา กระบวนการผลิต และการจำหน่ายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ให้ประกอบด้วยคำว่า “หมอนทองจันทร์” หรือ “Monthong Chan Durian” หรือ “Monthong Chan”

(2) ให้ระบุชื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการฯ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จัดจำหน่าย และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะเวลาที่ควรบริโภค ขนาดบรรจุ วันที่ผลิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และมาตรฐานสินค้า เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการรับทราบข้อมูลสินค้าและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาและเทือกเขาสำคัญ ได้แก่ เทือกเขาสอยดาว เทือกเขาฉิมชุก เทือกเขาสระบาป เขาชะเมา และเขาพลวง ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงและสามารถระบายน้ำได้ดี ลดปัญหาน้ำท่วมขังและเอื้อต่อการเจริญเติบโตของระบบรากทุเรียน ในด้านธรณีวิทยา พื้นที่บางส่วนมีดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินอัคนี รวมถึงหินบะซอลต์ (Basalt) ก่อให้เกิดดินร่วนถึงดินร่วนปนทรายที่มีโครงสร้างค่อนข้างโปร่ง ระบายน้ำได้ดี และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน โดยดินในพื้นที่มีแร่ธาตุสำคัญ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และเหล็ก ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ประกอบกับลักษณะดินที่มีความลึกและระบายน้ำได้ดี จึงเอื้อต่อการพัฒนาระบบรากและการดูดใช้ธาตุอาหารของต้นทุเรียน ด้านอุทกศาสตร์ จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี ลำน้ำและลำคลอง ตลอดจนแหล่งน้ำใต้ดิน ทำให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและสามารถบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของทุเรียนในแต่ละระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,000 – 3,000 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนและมีช่วงที่สภาพอากาศแห้งลง ก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งเอื้อต่อการควบคุมปริมาณน้ำในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวและการสะสมของแป้งและน้ำตาลในผลทุเรียน ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและคุณภาพของทุเรียน โดยลักษณะพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี ประกอบกับคุณสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบรากและการดูดใช้ธาตุอาหาร ขณะที่สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำที่เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะช่วงก่อนเก็บเกี่ยว มีส่วนสนับสนุนการสะสมของแป้งและน้ำตาล ส่งผลให้หมอนทองจันทร์มีลักษณะเด่น ได้แก่ เนื้อหนา สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม เนื้อเนียนละเอียด รสชาติหวานมัน และมีเนื้อแห้ง ไม่แฉะ อันเป็นลักษณะที่สะท้อนถึงคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

หมอนทองจันทร์ มีประวัติความเป็นมาสัมพันธ์กับการทำสวนไม้ผลของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองควบคู่กับไม้ผลสำคัญอื่น เช่น มังคุด เงาะ และลองกอง เป็นต้น ประกอบกับจังหวัดมีทำเลที่เอื้อต่อการค้าขายทางน้ำ จึงเป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร อาทิ ไม้หอม พริกไทย กระวาน และผลไม้ ส่งผลให้การทำสวนผลไม้และการค้าผลผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีต้นกำเนิดจากจังหวัดนนทบุรี โดยการนำกิ่งพันธุ์เข้ามาปลูกราว พ.ศ. 2473 – 2483 มีพื้นที่การปลูกในระยะแรก ได้แก่ อำเภอนาทม อำเภอชะเมา และอำเภอขลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำสวนผลไม้ดั้งเดิม ต่อมาได้ขยายพื้นที่และพัฒนาการผลิตโดยเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง จนทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะทุเรียนคุณภาพจากภาคตะวันออก โดยมีชื่อเสียงจากการจำหน่ายภายใต้ชื่อ “หมอนทองจันทร์” จากการเป็นศูนย์กลางการรวบรวม คัดคุณภาพ และส่งออกทุเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณลักษณะของทุเรียนพันธุ์หมอนทองของจังหวัดจันทบุรีในด้านเนื้อมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม เนื้อหนา เนียนละเอียด มีรสชาติหวานมัน กลิ่นหอมปานกลางตามธรรมชาติของทุเรียน และมีเมล็ดลีบหรือเมล็ดขนาดเล็ก

จังหวัดจันทบุรียังมีบทบาทสำคัญต่อระบบการค้าทุเรียนของประเทศไทย ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดค้าส่ง และตลาดส่งออก โดยการส่งออกทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากระยะแรกที่เริ่มขยายตลาดไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วง พ.ศ. 2518 – 2530 ต่อมาขยายสู่ตลาดเอเชียในช่วง พ.ศ. 2530 – 2545 และเข้าสู่ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา การขยายตัวดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตทุเรียนของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับหลักหมื่นตันในระยะเริ่มต้นของการค้าส่งออก เป็นกว่า 645,942 ตัน ในปี พ.ศ. 2569 สะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพการผลิต ความเชี่ยวชาญของเกษตรกร และความเชื่อมั่นของตลาดต่อทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากจังหวัดจันทบุรี

4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิต หมอนทองจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามแผนที่

5. การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) หมอนทองจันทร์ ต้องปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าหมอนทองจันทร์ รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) ให้มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมอนทองจันทร์
- (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมอนทองจันทร์ และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ หมอนทองจันท



ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิต หมอนทองจันท ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี