



กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์

เล่มที่ 60  
วันที่ประกาศโฆษณา

เลขที่ประกาศ 180  
2 ธันวาคม 2564

ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เลขที่คำขอ	63100230	วันที่ยื่นคำขอ	11 กุมภาพันธ์ 2563
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	สับปะรดศรีเชียงใหม่ (Sri Chiang Mai Pineapple หรือ Sab Pa Rod Sri Chiang Mai)		
รายการสินค้า	สับปะรด		
ผู้ขอขึ้นทะเบียน	จังหวัดหนองคาย		
ที่อยู่	ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000		

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

สับปะรดศรีเชียงใหม่ (Sri Chiang Mai Pineapple หรือ Sab Pa Rod Sri Chiang Mai) หมายถึง สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รูปผลทรงรี ร่องตาดัน ก้านสั้น เปลือกบาง เนื้อเส้นใยละเอียด มีสีเหลืองเข้ม (สีน้ำผึ้ง) มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ แกนหวานกรอบ รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ของจังหวัดหนองคาย

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์สับปะรด : พันธุ์ปัตตาเวีย

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง ทรงรี ก้านสั้น น้ำหนักตั้งแต่ 0.5 – 4 กิโลกรัม
- เปลือกผล เปลือกบาง ตากว้าง ร่องตาดัน ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเขียวเข้มเป็นมัน หรือสีเขียวมเหลือง
- เนื้อ เนื้อเส้นใยละเอียด มีสีเหลืองเข้ม (สีน้ำผึ้ง) แกนหวานกรอบ มีกลิ่นหอม
- รสชาติ หวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวาน อยู่ระหว่าง 15.5 - 19 องศาบริกซ์

## 2. กระบวนการผลิต

**ต้นพันธุ์** หน่อพันธุ์หรือจุกพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายเท่านั้น โดยหน่อพันธุ์มีขนาดความสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร หรือจุกมีขนาดความสูงประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร

### การเตรียมดิน

#### (1) ไถตากดิน

(1.1) ไถตะ (ไถเปิดหน้าดิน) 1 ครั้ง ให้มีความลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร

(1.2) หลังจากไถตะ 7 - 15 วัน จะทำการไถพรวนให้มีความลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร โดยไถพรวน 2 รอบ แต่ละรอบใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 7 - 15 วัน

#### (2) เตรียมแนวปลูก

แนวปลูกให้เว้นระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไม่ยกร่องดิน

### การปลูก

(1) ขุดหลุมลึกประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร หลุมปลูกแต่ละต้นมีระยะห่างประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

(2) ใช้หน่อพันธุ์หรือจุก จำนวน 6,000 - 7,000 หน่อหรือจุก ต่อ 1 ไร่

(3) คลุมหญ้าคาหรือพืชอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หลังจากดอกม่วงของสับปะรดร่วงแล้ว เพื่อเป็นการพรางแสง ป้องกันไม่ให้สับปะรดได้รับแสงแดดมากเกินไป

### การดูแลรักษา

(1) การกำจัดวัชพืช ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังจากปลูกสับปะรดประมาณ 2 - 3 เดือน โดยใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น ไดยูรอน โพรมาซิล ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และน้ำ เป็นต้น ผสมกันในอัตราส่วนขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัชพืช หรืออาจใช้วิธีกำจัดวัชพืชอื่นตามความเหมาะสม

(2) การใส่ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต ประมาณ 3 ครั้ง เช่น ครั้งที่ 1 ช่วง 3 - 4 เดือน ครั้งที่ 2 ช่วง 6 - 8 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อสับปะรดติดดอกม่วง เป็นต้น หรือตามความเหมาะสม ซึ่งการให้ปุ๋ยครั้งที่ 2 ต้องเว้นระยะเวลาห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยให้ปุ๋ยบริเวณโคนต้นหรือฉีดพ่นทางใบ

(3) การให้น้ำ หากเป็นช่วงฤดูฝน และปริมาณน้ำฝนเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ หากเป็นช่วงฤดูร้อน จะต้องให้น้ำในปริมาณ 20,000 ลิตร/ไร่/เดือน หรือตามความเหมาะสม และงดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน

### การเก็บเกี่ยว

- (1) สับปะรดศรีเชียงใหม่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
- (2) หากปลูกด้วยหน่อพันธุ์ จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 14 - 16 เดือน หรือหากปลูกด้วยจุก จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 20 - 24 เดือน
- (3) สังเกตสีเปลือกของสับปะรด จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน - กันยายน) หรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวมเหลืองในช่วงฤดูร้อน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม)
- (4) ตัดที่ก้านผล ให้เหลือก้านยาวติดผลไว้ประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร และตัดจุกให้เหลือประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร

### การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ให้ประกอบด้วย

- (1) ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สับปะรดศรีเชียงใหม่” หรือ “Sri Chiang Mai Pineapple” หรือ “Sab Pa Rod Sri Chiang Mai”
- (2) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ติดต่อได้
- (3) รอบการเก็บเกี่ยวหรือวันที่เก็บเกี่ยว

## 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

### ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่ละติจูด 17 องศา 56 ลิปดา 9 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 102 องศา 30 ลิปดา 11 ฟลิปดาตะวันออก ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 56 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 198 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าโปร่งและเนินเขา มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศเหนือ ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตร ลักษณะพื้นที่เพาะปลูกเป็นชุดดินโพนพิสัย กลุ่มชุดดินที่ 49 มีลักษณะดินต้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดี มีธาตุโพแทสเซียมสูง และมีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) อยู่ในช่วง 4.5 - 6.5

### ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.5 องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อำเภอศรีเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 70.58 ซึ่งหากปีใดที่มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำแก่สับปะรดศรีเชียงใหม่เพิ่ม

จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลให้สับปะรดศรีเชียงใหม่ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สามารถเจริญเติบโตได้ดีมีคุณภาพ รสชาติหวานฉ่ำ แแกนหวานกรอบรับประทานแล้วไม่กัดลิ้น รวมถึงเนื้อเส้นใยละเอียด มีสีเหลืองเข้ม (สีน้ำผึ้ง) และมีกลิ่นหอม ต่างจากสับปะรดที่ปลูกในพื้นที่อื่นของจังหวัดหนองคาย

#### **ประวัติความเป็นมา**

สับปะรดศรีเชียงใหม่ ได้เริ่มปลูกที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยมีเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ นำหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มาทดลองปลูกจำนวน 1 ไร่ และได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงประสบการณ์ในการปลูกพืชสวนมาประยุกต์ใช้กับการปลูกสับปะรด โดยการปลูกเรียงเป็นแถวขวางกับแนวแสงแดด มีการคลุมหญ้าคา หลังจากดอกม่วงของสับปะรดร่วงแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผลใหม่ กระทั่งมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเข้ามารับซื้อสับปะรดของอำเภอศรีเชียงใหม่นำไปแปรรูป ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกสับปะรดเพิ่มมากขึ้นในทุกตำบลของอำเภอศรีเชียงใหม่ เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดผลสดและส่งโรงงานแปรรูปต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) รวมถึงได้มีการตรวจวิเคราะห์หน้าดินและพัฒนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การปลูกสับปะรดมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้สับปะรดศรีเชียงใหม่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีร่องตาตื้น ผิวเปลือกไม่ไหม้ เนื้อเส้นใยละเอียด ไม่เป็นแกนดำ มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ และไม่แสบลิ้นหรือกัดลิ้นเหมือนสับปะรดทั่วไป นอกจากนี้ อำเภอศรีเชียงใหม่ยังมีการจัดงานเทศกาลประจำปี “วันสับปะรดหวาน” เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สับปะรดศรีเชียงใหม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าสับปะรดศรีเชียงใหม่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ท็อปส์ มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เป็นต้น

#### **4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์**

ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิต สับปะรดศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รายละเอียดตามแผนที่

#### **5. การพิสูจน์แหล่งกำเนิด**

- (1) สับปะรดศรีเชียงใหม่ จะต้องปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกและผู้ประกอบการค้า สับปะรดศรีเชียงใหม่ รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

**6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15**

(1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดศรีเชียงใหม่

(2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดศรีเชียงใหม่ และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

-----

## แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สับปะรดศรีเชียงใหม่



ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิต สับปะรดศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่  
จังหวัดหนองคาย